

Artículos escogidos por el editor de la revista *Menopause* de los números de enero-febrero 2008

- * Thurston RC, Bromberger J, Chang Y, et al. Abuso o negligencia en la niñez está asociado con aumento de los síntomas vasomotores reportados en mujeres de edad mediana. *Menopause* 2007; 15: 16-22.

Los hallazgos del Study of Women's Health Across the Nation Mental Health Study indican que la experiencia de negligencia y abuso en la niñez están asociados con el aumento de los síntomas vasomotores en la edad mediana

- * Van der Stege JG, Groen H, van Zadelhoff SJ, et al. Disminución de la concentración de andrógenos y disminución del estado de salud sexual y general en mujeres con falla ovárica prematura. *Menopause* 2007; 15: 23-31.

Este estudio describe el estado de salud general y sexual con falla ovárica prematura e investiga la relación entre sus niveles hormonales (estrógenos y andrógenos) y el funcionamiento sexual.

- * Bair YA, Gold EB, Zhang G, Rasor N, et al. El uso de medicina complementaria y alternativa durante la transición menopáusica : resultados longitudinales del estudio Women's Health Across the Nation. *Menopause* 2007; 15: 32-43.

Datos de seis años de seguimiento longitudinal del estudio Women's Health Across the Nation (SWAN) fueron usados para determinar la relación de la raza (etnicidad), el estatus menopáusico y tiempo calendario para el uso de cinco clases de medicina alternativa y complementaria. Aunque el uso fue estable en el tiempo, significativamente más mujeres blancas y japonesas que otros grupos étnicos reportaron uso, el cual no estuvo fuertemente asociado con cambios en el estado menopáusico, aunque este último difiere por raza/etnicidad y por tipo de medicina complementaria y alternativa.

- * Mirza FS, Ong P, Collins P, et al. Efectos del bloqueador de receptores de angiotensina II,

e irbesartan y el estradiol en la función vascular de las mujeres posmenopáusicas. *Menopause* 2007; 15: 44-50.

Mujeres posmenopáusicas hipertensas se trataron con irbesartan, un bloqueador de los receptores de angiotensina con y sin adición de estradiol. Un número significativamente mayor número de mujeres en el grupo de irbesartan y estradiol tenían una reducción de en las presiones sistólicas y diastólicas comparadas con el grupo de irbesartan solo, sugiriendo que el estradiol puede aumentar el efecto antihipertensivo del irbesartan.

- * Reed SD, Newton KM, LaCroix AZ, et al. Hallazgos vaginales endometriales y hormonas reproductivas: estudio randomizado controlado con placebo de black cohosh, hierbas multibotánicas y soya en la dieta para síntomas vasomotores: the Herbal Alternatives for Menopause (HALT) Study. *Menopause* 2007; 15: 51-58.

El black cohosh usado solo, o como parte de un producto multibotánico con o sin dieta de soya, no tiene efecto en el epitelio o la sequedad vaginal, la ciclicidad menstrual, patrones anormales de sangrado, patología endometrial u hormonas reproductivas.

- * Pal L, Hailpem SM, Santoro NF y colaboradores. La asociación de prolapso de órganos pélvicos y las fracturas en mujeres posmenopáusicas: análisis de datos basales del estudio Women's Health Initiative Estrogens Plus Progestetin. *Menopause* 2007; 15: 59-66.

Datos basales del estudio Women's Health Initiative Estrogens Plus Progestin fueron analizados para determinar si había una prevalencia mayor de tiempo de fracturas posmenopáusicas en asociación con rectocele de moderado a severo como una patología común de base.