Este estudio de Sedlak y colaboradores realza el valor de la información de DMO en términos de no solo el diagnóstico de osteoporosis sino de la influencia en los comportamientos de los pacientes. Como nos movemos en la ERS de un nuevo paradigma de riesgo absoluto de fractura, de la Organización Mundial de la Salud que se basa solo los factores clínicos, no nos olvidemos del papel crucial de la información de la DMO.

Stuart L. Silverman, MD FACP FACR
Attending Physician Cedars-Sinai Medical Center
Clinical Professor of Medicine and Rheumatology
David Geffen School of Medicine, UCLA
Medical Director, OMC Clinical Research Center
Beverly Hills, CA

Artículos escogidos por el editor en el número noviembre-diciembre del órgano oficial de NAMS: *Menopause*

* Mueck AO, Genazzani AR, Samsioe G, Vukovic- Wysocki I, Seeger H. Low-dose continuous combinations of hormone therapy and biochemical surrogate markers for vascular tone and inflammation: transdermal versus oral application. *Menopause* 2007; 14: 978-984.

Se trata del uso de bajas dosis de estradiol trasdérmico y terapia oral usando estradiol y acetato de noretisterona con un efecto favorable sobre los marcadores bioquímicos cardiovasculares.

* Shifren JL, Desindes S, McIlwain M, Doros G, Mazer NA. A randomized, open-label, crossover study comparing the effects of oral versus transdermal estrogen therapy on serum androgens, thyroid hormones, and adrenal hormones in naturally menopausal women. *Menopause* 2007; 14: 985-994.

Este estudio compara los efectos de estrógenos conjugados orales (0.625 g/día) frente a estradiol transdérmico (0.05 mg/día) sobre las concentraciones de testosterona total y libre, tiroxina, y cortisol y sus globulinas sexuales transportadoras: globulina trasportadora de tiroxina y globulina trasportadora de cortisol en mujeres con menopausia natural.

* Bender CM, Sereika SM, Brufsky AM, Ryan CM, et al. Memory impairments with adjuvant anastrozole versus tamoxifen in women with early-stage breast cancer. *Menopause* 2007; 14: 995-998.

Se comparó la función cognitiva en 31 mujeres con un estado temprano de cáncer de mama quienes recibieron tamoxifén con las que recibieron anastrazole en un estudio seccionado cruzado. Los resultados mostraron que las mujeres que recibieron anastrazole tenían más lento aprendizaje verbal y visual y memoria que las mujeres que recibieron tamoxifeno.

* Spetz AC, Palmefors L, Skobe RS, et al. Testosterone correlated to symptoms of partial androgen deficiency in aging men (PADAM) in an elderly Swedish population. *Menopause* 2007; 14: 999-1005.

Una investigación seccionada y cruzada de 370 hombres suecos, de 55 a 75 años de edad, preocupados por los síntomas de deficiencia parcial de andrógenos correlacionados con las concentraciones sanguíneas de testosterona y testosterona libre.

* Palacios S, Pornel B, Bergeron C, Chantre P, et al. Endometrial safety assessment of a specific and standardized soy extract according to international guidelines. *Menopause* 2007; 14: 1006-1011.

Se demostró la seguridad endometrial de un extracto de isoflavona específica y estandarizada (Phytosoya) en 305 mujeres posmenopáusicas tratadas por 12 meses.