Perlas

El perfil de los factores de riesgo de las ancianas da información para el tratamiento del cáncer ovárico

Examinan los riesgos y beneficios del tratamiento estándar para el cáncer ovárico avanzado en mujeres ancianas.

Fuente: International Journal of Gynecological Cancer 2008; 18: 896-907

MedWire News: la evaluación de múltiples factores de riesgo tales como el estadio de la enfermedad y la presencia de comorbilidades podría ayudar a predecir si las mujeres ancianas con cáncer ovárico avanzado tienen probabilidades de beneficiarse del tratamiento, indica una investigación.

En dichas pacientes, "una delgada línea separa las intervenciones médicas beneficiosas y las perjudiciales", dicen Andreas Obermair (Queensland Centre for Gynaecological Cancer, Brisbane, Australia) y colaboradores.

El equipo investigador analizó datos de los Registros Estadounidenses de Vigilancia, Epidemiología y Resultados Finales de Cáncer correspondientes a 3.994 mujeres de 65 años de edad o más con cáncer ovárico estadio III o IV.

El factor de riesgo más fuerte de muerte en el curso de un año del diagnóstico fue someterse a cirugía o a quimioterapia solas, más que el tratamiento combinado. Otros factores de riesgo incluyeron tener más de 85 años de edad en comparación con 60 a 69 años (coeficiente de riesgo = 7,04), patología en estadio IV (coeficiente de riesgo = 2,10), y tratamiento en un hospital pequeño en lugar de un centro integral contra el cáncer (coeficiente de riesgo = 2.17).

La presencia de comorbilidades tales como enfermedad cardiovascular y enfermedad renal también tuvo un impacto importante en la supervivencia a un año.

"El perfil de factores de riesgo establecido podría ser útil para planificar futuros ensayos clínicos para establecer el tratamiento óptimo para las pacientes ancianas con cáncer ovárico en estadio avanzado", concluyen los autores del estudio.