Artículos escogidos por el editor de la revista *Menopause* en el periodo mayo-junio

- Avis NE, Brockwell S, Randolph JF, Shen S, Cain VS, Ory M, Greendale GA. Longitudinal changes in sexual functioning as women transition through menopause: results from the Study of Women's Health Across the Nation. *Menopause* 2009; 16: 442-452.

  Resultados mostraron dolor aumentado durante el acto sexual y el deseo sexual disminuido en la transición menopáusica, mientras la masturbación aumenta durante la transición temprana, pero disminuye en la menopausia.

- Col N, Politi M, Guthrie J. Duration of vasomotor symptoms in middle-aged women: a longitudinal study. *Menopause* 2009; 16: 453-457.

  Se reanalizaron datos primarios de 438 mujeres en un estudio longitudinal de cohorte de 13 años para estimar la duración de los fogajes vasomotores.

  El promedio de duración de los síntomas vasomotores en la muestra es de más de cinco años, sustancialmente mayor que el previamente reportado.

- Grady D, Sawaya GF, Johnson KC, et al. MF101, a selective estrogen receptor β modulator for the treatment of menopausal hot flushes: a phase II clinical trial. *Menopause* 2009;16:458-465.

  Los resultados de un estudio randomizado, ciego, fase II, en 217 mujeres posmenopáusicas con fogajes sugieren que un extracto herbal chino con acción sobre receptor β selectivo reduce la frecuencia de los fogajes.

- Wood CE, Lees CJ, Cline JM. Mammary gland and endometrial effects of testosterone in combination with oral estradiol and progesterone. *Menopause* 2009; 16: 466-476.

  Los hallazgos de este trabajo no apoyan la idea de que la testosterona antagoniza los efectos de la terapia combinada sobre la proliferación mamaria o los marcadores de actividad del receptor estrogénico. En general, el efecto a corto plazo de la co-terapia con testosterona en la glándula mamaria y el endometrio fue mínimo.

- Bardia A, Novotny P, Sloan J, Barton D, Loprinzi C. Efficacy of nonestrogenic hot flash therapies among women stratified by breast cancer history and tamoxifen use: a pooled analysis. *Menopause* 2009; 16: 477-483.

  Un meta-análisis de estudios disponibles evaluando el uso de terapias no estrogénicas para los fogajes en grupos de participantes con o sin historia de uso concomitante de tamoxifén apoyan la idea de que todos los tratamientos afectan los fogajes igualmente bien en todos los grupos participantes.