

Uso de AH asociado con edad, efectos secundarios y estado de VIH en África y Tailandia

Examinan el abandono de la anticoncepción hormonal y factores asociados con el abandono entre mujeres no infectadas por el VIH, y el efecto de un diagnóstico de VIH en el uso de anticoncepción

Fuente: Contraception 2010; Advance online publication

Week 44 - 09 Nov 2010

MedWire News: investigadores dicen que una edad joven, los efectos secundarios, y el uso frecuente de preservativos masculinos se encuentran entre las razones más comunes para abandonar la anticoncepción hormonal (AH).

El estudio de 4461 mujeres de Uganda, Zimbabwe y Tailandia inicialmente no infectadas con el VIH también reveló que la mayoría de las usuarias de AH continúa con este método tras un diagnóstico de VIH, y una cuarta parte de las no usuarias comenzaron a utilizar AH.

“Las mujeres jóvenes, que informan efectos secundarios, y las que utilizan preservativo masculino podrían beneficiarse del asesoramiento continuo sobre anticoncepción”, dicen Kavita Nanda, de Family Health International, en Carolina del Norte, EE.UU., y colaboradores.

Una mayor proporción (36 por ciento) de usuarias de acetato de medroxiprogesterona de depósito (DMPA) inyectable versus 24 por ciento de usuarias de anticonceptivos orales (AO) abandonaron su método anticonceptivo durante el estudio.

Experimentar tensión mamaria aumentó el riesgo de abandono de AH 2,15 veces en las usuarias de AO y 2,25 veces en las usuarias de DMPA. Las mujeres que siempre usaron preservativos masculinos también fueron 2,45 y 2,10 veces más propensas a abandonar los AO y el DMPA, respectivamente, que las mujeres que nunca usaron preservativos masculinos.

Las mujeres jóvenes (18 a 20 años) fueron 1,23 y 1,38 veces más proclives a abandonar el uso de AO y de DMPA, respectivamente, que las mujeres de 30 años o más.

Entre 194 mujeres recientemente diagnosticadas con VIH, de las 137 usuarias de AH, el 98,5% continuó su uso, y de las 57 no usuarias de AH, el 24,6 por ciento comenzó a usar AH tras su diagnóstico.

MedWire (www.medwire-news.md) es un servicio independiente de noticias clínicas proporcionado por Current Medicine Group, parte de Springer Science+Business Media. © Current Medicine Group Ltd; 2010.