Artículos escogidos por el editor de la revista *Menopause*

- **GIBSON CJ, THURSTON RC, BROMBERGER JT, KARMARCK T, MATTHEWS KA.**

  Negative affect and vasomotor symptoms in the Study of Women's Health Across the Nation Daily Hormone Study. Menopause 2011;18:1270-1277.

  Aun cuando comúnmente se ha encontrado una relación entre síntomas vasomotores autorreportados y mediciones de afecto negativo, la relación temporal entre estos factores no es clara. En un examen de esta relación, usando datos prospectivos de apuntes diarios, los efectos negativos fueron más tendientes a ser reportados en el mismo día y el día después de la experiencia de síntomas vasomotores.

- **COSTA-PAIVA L, GODOY CE, ANTUNES A, CASEIRO JD, ARTHUSO M, PINTO-NETO AM.**

  Risk of malignancy in endometrial polyps in premenopausal and postmenopausal women according to clinicopathologic characteristics. Menopause 2011;18:1278-1282.

  La tasa de prevalencia de malignidad en los pólipos endometriales fue del 2.5% y fue mayor en mujeres con sangrado posmenopáusico y edad avanzada.

- **WAETJEN LE, JOHNSON WO, XING G, ET AL, FOR THE STUDY OF WOMEN'S HEALTH ACROSS THE NATION.**

  Serum estradiol levels are not associated with urinary incontinence in midlife women transitioning through menopause. Menopause 2011;18:1283-1290.

  Valores de mediciones anuales y cambios año a año en los niveles endógenos de estradiol no tienen efecto en el desarrollo y agravamiento de la incontinencia urinaria en mujeres en la transición menopáusica.

- **WOODARD GA, MEHTA VG, MACKEY RH, ET AL.**

  C-reactive protein is associated with aortic stiffness in a cohort of African-American and white women transitioning through menopause. Menopause 2011;18:1291-1297.

  Este estudio demostró una fuerte y significativa asociación entre la proteína C reactiva y la velocidad de las ondas de pulso en una cohorte de mujeres quienes habían alcanzado la perimenopausia tardía o estado posmenopausia comparado con mujeres quienes eran premenopáusicas o perimenopáusicas tempranas.