

Función sexual y factores asociados con disfunción sexual en mujeres climatéricas

Sexual function and factors associated with sexual dysfunction in climacteric women

Rev Bras Ginecol Obstet. 2014 Nov; 36(11): 497-502.

CAVALCANTI IF, FARIAS PD, ITHAMAR L, SILVA VM1, LEMOS A.

Se evaluó la función sexual y los factores asociados con la disfunción sexual en las mujeres climatéricas en un estudio transversal que se llevó a cabo en 173 mujeres de 35 a 65 años de edad, con una pareja estable durante los últimos 6 meses, que saben leer y escribir, sin deterioro cognitivo, y con actividad sexual durante al menos 6 meses. El instrumento utilizado para evaluar el desempeño sexual fue el cociente sexual, versión femenina. La asociación entre la disfunción sexual y datos sociodemográficos, antecedentes personales, obstétricos y sexuales se determinó mediante la prueba χ^2 de Pearson y la fuerza de la asociación por la odds ratio (OR) con un intervalo de confianza del 95 % (IC del 95 %).

Resultados: En este estudio, el 46,2 % de las mujeres reportaron una disfunción sexual.

Hubo una disminución en el riesgo de disfunción sexual para el grupo de edad entre 35 y 49 años de edad (OR = 0,3, IC 95 %: 0,2-0,6) y para las mujeres que se sentían cómodas hablando sobre el sexo (OR = 0,5; IC del 95 %: 0,2 -0,8). Sin embargo, la presencia de osteoporosis (OR = 3,3; IC del 95 % 1,05 - 07,06), la incontinencia urinaria (OR = 2,0; IC del 95 %: 01,01 a 03,07) y las correcciones quirúrgicas del suelo pélvico (OR = 2,2; IC del 95%: 1,1 -4,5) aumentaron la probabilidad de disfunción sexual.

Los autores concluyen que la frecuencia de la disfunción sexual en las mujeres de entre 35 y 65 años fue del 46,2 % y factores tales como la osteoporosis, la incontinencia urinaria y correcciones quirúrgicas del suelo pélvico aumentaban la probabilidad de disfunción sexual.