

## Prevención con vacuna de herpes zóster en adultos mayores

LAL H, CUNNINGHAM AL, GODEAUX O, ET AL.

ZOE-50 Study Group. *Efficacy of an adjuvanted herpes zoster subunit vaccine in older adults. N Engl J Med.* 2015; 372(22): 2087-2096.

Un estudio de fase 3 de una vacuna subunidad herpes zóster se realizó en 15.411 participantes para evaluar la seguridad y eficacia en los adultos mayores. Los participantes fueron estratificados por grupos de edad (50 a 59 años; 60 a 69 y 70 o más) y recibieron 2 dosis intramusculares de la vacuna (n = 7698) o placebo (n = 7.713) con 2 meses de diferencia. Durante un seguimiento medio de 3,2 años, el herpes zóster se confirmó en 6 participantes en el grupo de la vacuna y 210

participantes en el grupo placebo. Así, la eficacia de la vacuna varió entre 97,2% y 97,9% en todos los grupos de edad, y la eficacia en el grupo de 70 años y mayores fue similar a la de los otros grupos de edad. Las reacciones sistémicas y en el sitio de la inyección fueron más frecuentes en el grupo de la vacuna, y la proporción de participantes que tenían efectos adversos graves o enfermedad inmune mediada potencial o que murieron fue similar en los dos grupos.