La terapia con estrógeno solo y la incidencia invasiva de cáncer de mama por dosis, formulación y vía de administración: hallazgos del estudio observacional WHI

Estrogen-alone therapy and invasive breast cancer incidence by dose, formulation, and route of delivery: findings from the WHI observational study

Neurotox Res. 2018 May 5. doi: 10.1007/s12640-018-9909-z. [Epub ahead of print]

Shufelt C, Bairey Merz CN, Pettinger MB, Choi L, Chlebowski R, et al; Women?s Health Initiative Investigators

Objetivo

La investigación sobre las relaciones entre las diferentes dosis de terapia hormonal, la formulación y las vías de administración, y la posterior incidencia de cáncer de mama ha sido limitada. Este estudio comparó directamente diferentes dosis de estrógenos, formulaciones y vía de administración de estrógeno solo entre mujeres con una histerectomía en relación con la incidencia de cáncer de mama invasivo.

Material y métodos

El Women's Health Initiative Observational Study es un gran estudio de cohorte prospectivo multicéntrico llevado a cabo en 40 sitios de EE. UU. Los análisis incluyeron 26,525 mujeres posmenopáusicas con histerectomía, con edades entre 50 y 79 años, al inicio del estudio, r Neurotox Res. 2018 5 de mayo. Doi: 10.1007 / s12640-018-9909-z. [Epub antes de imprimir]